



สถานการณ์โรคติดต่อที่มีความสำคัญสูง และใช้เลือดออก
จังหวัดอุบลราชธานี
สัปดาห์ที่ 45 พ.ศ. 2568
(1 มกราคม – 5 พฤศจิกายน 2568)

เครือข่ายสุขภาพอำเภอม่วงสามสิบ



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2568

ประจำสัปดาห์ที่ 45

สถานการณ์ ระดับประเทศ

สถานการณ์โรคไข้
เลือดออกย้อนหลัง



ป่วย
(ราย)

อัตราป่วย
(/100,000 ปชก.)

2568	2567	2566	2565	2564	2563
51,294	96,631	137,151	38,920	9,321	68,928
79.21	146.25	207.39	60.86	14.08	103.85



ตาย
(ราย)

อัตราป่วยตาย
(ร้อยละ)

51	85	155	25	6	49
0.10	0.08	0.10	0.10	0.08	0.07

จำนวนผู้ป่วย พ.ศ.2568 น้อยกว่า พ.ศ.2567 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ประมาณ **1.9** เท่า



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2568

ประจำสัปดาห์ที่ 45

สถานการณ์ ระดับประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 5 พ.ย. 68

ป่วย	51,294	ราย
อัตราป่วย	79.21	/100,000 ปชก.
ตายสะสม	51	ราย
อัตราป่วยตาย	0.09	ร้อยละ

รายงานเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย	+883	ราย
ตาย	+3	ราย




อาชีพ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ไม่ระบุ	13,888	27.08%
นักเรียน/นักศึกษา	11,279	21.99%
รับจ้าง	9,922	19.34%
ในปกครอง	5,908	11.52%
เกษตรกรกรรม	2,379	4.64%
อื่น ๆ	1,837	3.58%


AGE	มากที่สุด (ปี)	มัธยฐาน (ปี)	น้อยสุด (ปี)
	101	21	0

กลุ่มอายุ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	2,612	101.59	1	0.04
5-14 ปี	14,620	204.16	10	0.07
15-24 ปี	11,239	140.91	8	0.07
25-34 ปี	8,826	94.12	5	0.06
35-44 ปี	5,585	59.09	2	0.04
45-54 ปี	3,589	35.60	10	0.28
55-64 ปี	2,653	29.15	9	0.34
65 ปีขึ้นไป	2,170	24.02	6	0.28

สัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอาการ



สัดส่วนผู้ป่วย IPD และ OPD



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค พ.ศ. 2568

ภาค	ป่วย(ราย)	อัตราป่วย	ตาย(ราย)	อัตราป่วยตาย
ภาคใต้	10,008	106.26	13	0.13
ภาคเหนือ	11,157	95.45	13	0.12
กรุงเทพฯ	4,123	77.58	1	0.02
ภาคตะวันออกเฉียง...	14,712	68.22	9	0.06
ภาคกลาง (ไม่รวมก...	11,294	51.15	15	0.13

[ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต](#)



สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเสียชีวิต พ.ศ. 2568

กองโรคติดต่อภายใน โดยแมลง กรมควบคุมโรค

59

ราย

เสียชีวิตสะสม



มีใน รง. 506 แล้ว 48 ราย

0.12

ร้อยละ

อัตราป่วยตาย



ชาย 30

ราย



หญิง 29

ราย

อัตราส่วนเพศชาย:หญิง = **1:1**



น้อยที่สุด

5

ปี

มัธยฐาน

39

ปี

มากที่สุด

79

ปี


กลุ่มอายุ	ป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	2,612	0	0.00
5-14 ปี	14,620	13	0.09
15-24 ปี	11,239	9	0.08
25-34 ปี	8,826	6	0.07
35-44 ปี	5,585	3	0.05
45-54 ปี	3,589	9	0.25
55-64 ปี	2,653	10	0.38
65 ปีขึ้นไป	2,170	9	0.41



สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเสียชีวิต พ.ศ. 2568

กองโรคติดต่อภายใน กรมควบคุมโรค


ปัจจัยเสี่ยง



เด็ก (< 15 ปี)



ผู้ใหญ่
(15 ปีขึ้นไป)



จัดทำโดย: กลุ่มสื่อสารความยั่งยืน และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กองโรคติดต่อและโรคระบาด กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3133, 3151 Email: dybdrresponse@gmail.com



สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ที่มีความสำคัญสูง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2568



โรค / ภัยสุขภาพ	พ.ศ. 2567 (ทั้งปี)			พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ม.ค. – 5 พ.ย. 2568)			
	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย CFR (%)	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วย ต่อ ประชากร 1 แสนคน	อัตราป่วยตาย CFR (%)
1. ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)	24,392	8	0.03	25,835	6	1,391.44	0.02
2. ปอดอักเสบ (Pneumonia)	18,712	78	0.42	17,061	59	918.88	0.35
3. โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning)	9,210	-	0	9,727	-	523.88	0.00
4. โควิด 19 (Covid 19)	8,364	3	0.04	5,783	1	311.46	0.02
5. ไข้เลือดออก (DF,DHF,DSS)	3,859	3	0.08	1,808	1	97.45	0.06
6. โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease)	1,688	-	0	3,136	-	168.90	0.00
7. เห็ดพิษ (Mushroom Poisoning)	949	2	0.21	1,040	2	56.01	0.19
8. โรคmelioidosis (Meliodosis)	434	3	0.69	291	4	15.67	1.37
9. โรคฉี่หนู (Leptospirosis)	206	5	2.43	126	2	6.79	1.59
10. ไข้มาลาเรีย (Malaria)	6	-	0	4	-	0.22	0.00

ที่มา: รง. DDS (D506) กองระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี
เปรียบเทียบตามช่วงเวลาเดียวกันย้อนหลัง 5 ปี
สัปดาห์ที่ 45

	2568 *	2567	2566	2565	2564	2563
ป่วย (ราย)	1,827	2,151	2,527	535	1,709	1,480
อัตราป่วย (ต่อแสน)	98.48	115.17	135.30	28.51	91.07	78.87
เสียชีวิต (ราย)	1	0	0	0	0	0
อัตรามตาย (ร้อยละ)	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


จำนวนผู้ป่วย พ.ศ. 2568 **น้อยกว่า** พ.ศ. 2567 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน **1.1 เท่า**



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรวม จำแนกรายสัปดาห์ จ.อุบลราชธานี
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2568 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
ประจำสัปดาห์ที่ 45

จำนวนผู้ป่วยลดลงในช่วงต้นฤดูหนาว
เน้นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุก 7 วัน

ผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,827 ราย
อัตราป่วย 98.48 /แสนประชากร





ผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกรายอำเภอ ปี 2568

สัปดาห์ที่ 45

ลำดับ	อำเภอ	จำนวนป่วยสะสม (ราย)	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	ตาย	อัตราป่วยตาย	ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด	อัตราป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด
1	ดอนมดแดง	77	282.59	0	0	2	7.34
2	บุณฑริก	211	220.62	0	0	3	3.14
3	น้ำขุ่น	69	206.80	0	0	1	3.00
4	โพธิ์ไทร	78	174.59	0	0	7	15.67
5	เดชอุดม	308	173.23	0	0	2	1.12
6	ศรีเมืองใหม่	112	157.60	0	0	1	1.41
7	สิรินธร	81	146.48	0	0	8	14.47
8	นาเยีย	40	145.56	0	0	0	0.00
9	เหล่าเสือโก้ก	37	132.11	0	0	1	3.57
10	เขมราฐ	108	130.84	1	0.93	1	1.21
11	ตาลชุม	35	105.54	0	0	0	0.00
12	น้ำยืน	66	93.91	0	0	4	5.69
13	ม่วงสามสิบ	75	88.74	0	0	1	1.18

สถานการณ์ จังหวัดอุบลราชธานี



อัตราป่วยมากกว่า 50.0 /แสน



อัตราป่วย 25.0 - 49.9 /แสน



อัตราป่วย 0.1 - 24.9 /แสน



ไม่มีผู้ป่วย



ผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกรายอำเภอ ปี 2568

สัปดาห์ที่ 45

ลำดับ	อำเภอ	จำนวนป่วยสะสม (ราย)	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	ตาย	อัตราป่วยตาย	ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด	อัตราป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด
14	โขงเจียม	32	82.44	0	0	0	0.00
15	เขื่องใน	88	82.31	0	0	3	2.81
16	ทุ่งศรีอุดม	19	65.04	0	0	1	3.42
17	พิบูลมังสาหาร	86	64.86	0	0	4	3.02
18	สว่างวีระวงศ์	18	57.67	0	0	1	3.20
19	วารินชำราบ	84	52.34	0	0	4	2.49
20	เมืองอุบลราชธานี	114	50.74	0	0	6	2.67
21	สำโรง	19	35.07	0	0	3	5.54
22	นาจะหลวย	19	32.28	0	0	5	8.49
23	นาตาล	12	31.18	0	0	0	0.00
24	ตระการพืชผล	32	26.31	0	0	4	3.29
25	กุดข้าวปุ้น	7	17.08	0	0	0	0.00

สถานการณ์ จังหวัดอุบลราชธานี



อัตราป่วยมากกว่า 50.0 /แสน
อัตราป่วย 25.0 - 49.9 /แสน



อัตราป่วย 0.1 – 24.9 /แสน
ไม่มีผู้ป่วย

สถานการณ์โรคติดต่อที่มีความสำคัญสูง และโรคไข้เลือดออก

อำเภอวังสามสี

สัปดาห์ที่ 45 พ.ศ.2568

(1 มกราคม – 5 พฤศจิกายน 2568)






สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ พ.ศ.2568

ลำดับ	โรค/ภัยสุขภาพ	พ.ศ.2567 (ทั้งปี)			พ.ศ.2568 (วันที่ 1 ม.ค. - 5 พ.ย.2568)			
		จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย CFR (%)	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยต่อ ประชากรแสนคน	อัตราป่วย ตาย CFR (%)
1	Diarrhoea	2133	0	0	1917	0	2270.06	0
2	Influenza	1623	0	0	1414	0	1674.42	0
3	Coronavirus disease 2019	1029	0	0	667	0	789.74	0
4	Pneumonia	1129	0	0	993	0	1175.89	0
5	Food Poisoning	486	0	0	471	0	557.75	0
6	Scrub Typhus	99	0	0	235	0	278.28	0
7	ไข้เลือดออก	237	0	0	89	0	105.39	0
8	Hand foot and mouth disease	26	0	0	197	0	233.28	0
9	Mushroom Poisoning	84	0	0	41	0	48.55	0
10	Leptospirosis	32	2	4.26	17	0	20.13	0

15 อันดับโรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด

ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 30 (วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2568)






สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2568

ยอดผู้ป่วยสะสม 1 มกราคม – 5 พฤศจิกายน 2568

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

Spot map



จำนวนผู้ป่วย

89 ราย

เสียชีวิต

0 ราย

อัตราป่วย

105.39

ต่อประชากรแสนคน

อัตราป่วยตาย

ร้อยละ

0.0

ข้อมูลการรักษาในโรงพยาบาล (วันนี้)

ผู้ป่วยนอก

• 0

ผู้ป่วยใน

• 0

ส่งต่อ

• 0

เพศ

ชาย


หญิง

ร้อยละ

60.67


39.33

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกตามกลุ่มอายุ (ราย)



ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น กลุ่มนักเรียน อายุ 10 - 14 ปี (23.60%)
รองลงมาคือวัยรุ่น 15 - 24 (20.22%) และ 25 - 34 ปี (17.98%)

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก อำเภอม่วงสามสิบ จำแนกรายตำบล ปี 2568
(วันที่ 1 มกราคม - 5 พฤศจิกายน 2568)




สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอวังสามสี
เปรียบเทียบตามช่วงเวลาเดียวกันย้อนหลัง 5 ปี
สัปดาห์ที่ 45

	2568	2567	2566	2565	2564	2563
ป่วย (ราย)	89	147	115	45	44	104
อัตราป่วย (ต่อแสน)	105.39	174.07	136.18	53.20	12.64	119.35
ตาย (ราย)	0	0	0	0	0	0
อัตราตาย (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

จำนวนผู้ป่วย พ.ศ. 2568 น้อยกว่า พ.ศ. 2567 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 1.65 เท่า

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรวม จำแนกรายสัปดาห์ อ.ม่วงสามสิบ
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2568 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
ประจำสัปดาห์ที่ 45

จำนวนป่วย (ราย)





แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.อุบลราชธานี ปี 2568

1. ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงานทุกแห่ง มีกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน (ทุกวันศุกร์) รายงานผ่าน Smart อสม.
2. ใช้ 2 วัน ไม่ดีขึ้น ส่งพบแพทย์ ที่โรงพยาบาล
3. โรงพยาบาลจัดตั้ง Dengue Checkpoint, ใช้ Rapid test Ns1 antigen ช่วยวินิจฉัย, จ่ายสารทากันยุง และ Admit ผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกราย
5. รพ.สต.เริ่มใช้ Rapid test Ns1 antigen ช่วยวินิจฉัย
6. งด NSAIDs ใน ผู้ป่วย ใช้ทุกกรณี ทั้ง รพ/ คลินิก/ ร้านขายยา
7. อบต./ เทศบาลทุกแห่ง ให้จัดหาเคมีภัณฑ์ น้ำมัน จัดทีมพ่นเคมี ให้เพียงพอ และสามารถควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 ได้ตลอดทั้งปี และวางแผนงานรับภาระระบาดในปี 2568
8. เปิด EOC หากมีการระบาดมากกว่า 25% ของพื้นที่



5 ปุ่ปราบยุงลาย



ปิดฝาภาชนะ
ให้สนิท



ปล่อยปลา
กินลูกน้ำ



เปลี่ยนน้ำ
ที่ปิดภาชนะที่ไม่ได้ใช้



ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมไม่ให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์



ปฏิบัติเป็น
ประจำ ป้องกัน
ยุงลายไม่ให้กัด

2 ข.

1

กำจัดขยะ

2

ชั่งไข่ยุงลาย



สำรวจลูกน้ำ "ทุกบ้าน ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะหมดหน้าฝน"

นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทรแดง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ขอเชิญชวน

ชาวอุบลราชธานี

ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลาย

3 เก็บ 3 โรค

▶ โรคไข้เลือดออก
▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
▶ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

✓ เก็บบ้าน



✓ เก็บขยะ



✓ เก็บน้ำ



เพื่อป้องกันไข้เลือดออก
ไข้ซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย
สำรวจลูกน้ำ "ทุกบ้าน ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะหมดหน้าฝน"



นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทรแดง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



คำแนะนำสำหรับ การป้องกัน ไข้เลือดออก



ระวังการจ่ายยา NSAIDs

โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการไข้



หากมีอาการไข้สูงลอย นานเกิน 2 วัน

มีอาการสงสัยเป็นไข้เลือดออก ให้รีบไปพบแพทย์
งดการรับประทานยา NSAIDs
และ ไม่ควรซื้อยากินเอง



สถานพยาบาลจ่ายยากากันยุงให้ผู้ป่วย

โรคติดต่อมาโดยยุงลาย (ไข้เลือดออก / ไข้ซิกา / ไข้ปวดข้อยุงลาย)
ให้ผู้ป่วยใช้ต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 5-7 วัน



ผู้ป่วยและผู้ยู่ร่วมบ้าน ต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัด

เนื่องจากยุงสามารถแพร่เชื้อได้
ควรงดนอนในมุ้ง / สวมเสื้อผ้ามิดชิด / ทายากันยุง



ยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs)

คือยาบรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ
ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ มีผลข้างเคียง
อาจทำให้ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
เลือดออกและเป็นแผลในทางเดินอาหาร
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ เช่น
ยาไอบูโพรเฟน ยาไดโครฟีแนก
ยาแอสไพริน ยาไฟร็อกซิแคม
เป็นยาอันตรายที่ต้องสั่งจ่ายโดย
แพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น



หมั่นสำรวจและทำลาย

แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน
ขัดขอบภาชนะ จัดการขยะยุงลาย

ที่มา : ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อมาโดยแมลงที่ 7.1 ขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น



เผยแพร่ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Office of Disease Prevention and Control, 7 Khonkaen
www.ddc.moph.go.th/odpc7 โทร. 043-222818-9

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

มาตรการ สำหรับเจ้าหน้าที่

ควบคุม

3
3
1

โรค
ติดต่อ
นำโดยยุงลาย



มาตรการควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วย โรคติดต่อ นำโดยยุงลาย

เมื่อได้รับแจ้ง

ควรดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทันที
ตามมาตรการ 3-3-1 และเฝ้าระวัง
โรคต่อเนื่อง 28 วัน ดังนี้



3

สถานพยาบาลแจ้ง รพ.สต. หรือสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ที่ทราบว่ามีผู้ป่วย
โรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ภายใน 3 ชั่วโมง
หลังผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย

3

รพ.สต. หรือสถานบริการสาธารณสุข
ดำเนินการสอบสวนโรค ควบคุมยุงพาหะ
โดยการฉีดพ่นสารเคมี (เช่น สเปรย์กระพอง)
และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบ้านผู้ป่วย
ภายใน 3 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งพบผู้ป่วย



1

หน่วยงานท้องถิ่น พ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะ
และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ในบ้านผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย
ภายใน 1 วัน หลังได้รับแจ้งพบผู้ป่วย



สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ ณ สัปดาห์ที่ 1 - 45

ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. – 5 พ.ย.2568

ป่วย 1414 ราย
อัตราป่วย 12674.42 ต่อประชากรแสนคน
ตาย 0 ราย
อัตราป่วยตาย 0.00 %

อายุ


กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (ร้อยละ 20.72)
กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (ร้อยละ 17.89)
กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี (ร้อยละ 11.67)
กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (ร้อยละ 12.73)
กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี (ร้อยละ 10.04)

อาชีพ


- ในปกครอง (56.29 %)
- เกษตรกร (24.47%)

เพศหญิง : เพศชาย
1.18 : 1

อัตราป่วยไข้หวัดใหญ่สะสม รายตำบล



จำนวนผู้ป่วยจำแนกรายเดือน พ.ศ.2568 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง



จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน
ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม - ปัจจุบัน

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก อำเภอวังสามสีบ ณ สัปดาห์ที่ 1 - 45

ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. – 5 พ.ย.2568

ป่วย	197	ราย
อัตราป่วย	233.28	ต่อประชากรแสนคน
ตาย	0	ราย
อัตราป่วยตาย	0.00	%

อายุ

กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (ร้อยละ 71.07)


กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (ร้อยละ 24.37)

พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น


เพศหญิง : เพศชาย

1 : 1.16

อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก สะสม รายตำบล



จำนวนผู้ป่วยจำแนกรายเดือน พ.ศ.2568 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และ ปี 2567



จำนวนผู้ป่วย โรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงตุลาคม
มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน

ขอบคุณค่ะ

